Devoir Surveillé N°5

3 Février 2007

Durée 4h

(l'usage de la calculatrice est interdit dans ce DS)

Exercice N°1: (4 points)

1) On pose : $P = X^3 - (2 - 2i)X^2 + (5 - 4i)X + 10i$.

- Montrer que P a un zéro imaginaire pur que l'on déterminera .
- En déduire les zéros de P .

2) Soit $Q = X^4 - 2X^3 + 9X^2 - 8X + 20$.

- Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de Q par $(X - 2i)$.
- En déduire la décomposition de Q en produit d'irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.
- Déterminer la décomposition de Q en produit d'irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice N°2: (5 points)

n désigne un entier supérieur ou égal à 1 .

On considère la fonction f_n définie , pour tout x réel , par : $f_n(x) = x^5 + nx - 1$.

- Etudier les variations de f_n .
- En déduire que , pour tout n entier supérieur ou égal à 1, il existe un unique réel u_n tel que $f_n(u_n) = 0$.
- Montrer que : $u_n \leq \frac{1}{n}$; en conclure que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et donner sa limite .
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n$ et en déduire un équivalent de u_n . (On pourra utiliser 2)
- Déterminer un équivalent simple de $\frac{1}{n} - u_n$ lorsque n est au voisinage de l'infini .

Exercice N°3: (5 points) (d'après Alès Sup 2000)

Soit n un entier naturel non nul , on pose $A = (X + 1)^{2n} - 1$, polynôme de $\mathbb{R}[X]$.

- Montrer que l'on peut écrire $A = X \times B$ où B est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ dont on précisera le degré , le coefficient dominant et le terme constant noté b_0 .
- Déterminer les racines de A dans $\mathbb{C}$. On posera $z_0 = 0$ et les autres racines $z_1, z_2, \dots, z_{2n-1}$ seront mises sous forme trigonométrique .

On pose $P_n = \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.

- Montrer , à l'aide d'un changement d'indice , que $P_n = \prod_{k=n+1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.

En déduire que , si $Q_n = \prod_{k=1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$, alors $P_n = \sqrt{Q_n}$.

- Calculer de deux façons : $\prod_{k=1}^{2n-1} z_k$. Puis en déduire Q_n et enfin P_n .

- On pose $F = \frac{1}{A}$, déterminer la décomposition de F en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

T.S.V.P

Exercice N°4: (6 points) (d'après E3A PC 2005)

Soit $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ définie par $T_0(X) = 1, T_1(X) = X$ et la relation :

$$\forall n \geq 1, T_{n+1}(X) = 2XT_n(X) - T_{n-1}(X).$$

- 1) Déterminer les polynômes T_2 et T_3 .
- 2) a) Déterminer le degré T_m pour $m \in \mathbb{N}$.
b) Déterminer la parité de T_m pour $m \in \mathbb{N}$ (On distinguera deux cas selon que $m = 2p$ ou $m = 2p + 1$.
c) Déterminer le coefficient dominant de T_m pour $m \in \mathbb{N}$.

- 3) a) Etablir par récurrence les relations suivantes pour tout nombre réel x :

$$\forall n \in \mathbb{N}, T_n(\cos(x)) = \cos(nx) \text{ et } T_n(\operatorname{ch}(x)) = \operatorname{ch}(nx).$$

(On rappelle que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, 2\operatorname{ch}(a)\operatorname{ch}(b) = \operatorname{ch}(a+b) + \operatorname{ch}(a-b)$)

b) En déduire que $|T_n(u)| \leq 1$ pour $|u| \leq 1$.

c) Soit $n \geq 1$, Montrer que pour tout u dans $]1; +\infty[$, $|T_n(u)| > 1$. (On pourra poser $u = \operatorname{ch}(x)$) .

d) En déduire que si $n \geq 1$, pour tout u dans $]-\infty, -1[\cup]1; +\infty[$, $|T_n(u)| > 1$.

- 4) a) Pour $n \geq 1$, résoudre dans $[0; \pi]$ l'équation $T_n(\cos(x)) = 0$.

b) En déduire que , pour tout entier $n \geq 1$, T_n a n racines réelles dans $[-1; 1]$.

c) Soit $n \geq 1$, donner la décomposition de T_n en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

- 5) a) On pose $S_n = \sum_{k=0}^n t^k e^{ikx}$. Calculer S_n et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ lorsque $|t| < 1$.

b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n t^k \cos(kx) \right)$.

Exercice N°5: (2 points)

Soit $E = \mathbb{R}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients réels .

On pose $f : E \rightarrow E$ définie par $f(P) = XP' - P$.

- 1) Montrer que f est un endomorphisme de E .
- 2) Déterminer $\operatorname{Ker} f$.
- 3) Soit k un entier , résoudre l'équation différentielle $xy' - y = x^k$.
- 4) En déduire $\operatorname{Im} f$.